

Therapieplan:

	leicht	mittel	schwer
Ort	ambulant	stationär: Hämatologie	Sterilzelkherapie
Dekontamination	Duschen, Haare waschen, Ersatzkleider, Schneuzen, Laxantien, Erbrechen		
Latenzzeit		extreme Ruhigstellung	extreme Ruhigstellung
Gegengifte	Nach Einatmen Dexamethason-Spray Nach Verschlucken oder Einatmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Radiojod —Jod 2. Caesium - Kalium 3. Strontium - Calcium, Alginat 4. Caesium - Berliner Blau 5. Blei u. a. - DMPS (Polonium) 6. Plutonium - (Zn) DTPA 		
Gastroent. Infektabwehr Blutungen		Volumen- und Elektrolytsubstitution Antibiotika nach Austestung Frischbluttransfusionen, Thrombozytenkonzentrate, Infusion von homologem Knochenmark	
Unterstützung	Physiologische Jodzufuhr in endemischen Jodmangelgebieten: 100 µg / KJ täglich	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erw. 100 mg 8-stdl. Kinder die Hälfte, Säugl. ein Viertel 2. Erw. 25 mval, 12-stdl. 3. Erw. 500 mg 12-stdl. Kinder die Hälfte, Säugling ein Viertel 4. Erw. 500 mg 6-stdl. Kinder 8-stdl, Säugling ein Viertel 5. Erw. 100 mg 8 - s t d l . Kinder die Hälfte, Säugl. ein Viertel 6. Erw. 1000 mg 6-stdl. i. v. 	
Verlaufsbeobachtung	Differentialblutbild	Differentialblutbilder, Knochenmarkpunktionen, Chromosomenbestimmung	